

グリーンな栽培体系への転換サポート事業を活用した栽培暦（きぬむすめ）

作成年月日記入 令和7年7月9日

神戸市農業活性化協議会

| 月<br>旬  | 4月<br>下旬                                       | 上旬                                           | 5月<br>中旬                                     | 下旬                                           | 上旬                                           | 6月<br>中旬                                     | 下旬                                           | 上旬                                           | 7月<br>中旬                                     | 下旬                                           | 上旬                                           | 8月<br>中旬                                     | 下旬                                           | 上旬                                           | 9月<br>中旬                                     | 下旬                                           | 上旬                                           | 10月<br>中旬                                    | 下旬                                           |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 作業      |                                                |                                              | 播種                                           | 衛星を活用した<br>土壌診断                              | 元肥・代かき                                       | 苗箱防除                                         | 田植<br>除草剤                                    |                                              | （除草剤）                                        |                                              | 出穂20日前<br>衛星を活用した<br>葉色診断                    | 穂肥                                           | あぜ草刈り                                        | 出穂後5～10<br>出穂                                | カメムシ類防除                                      |                                              |                                              | （10月15日～10月20）<br>収穫                         |                                              |
| 水管理     | やや深水<br>浅水<br>中干し<br>間断灌水<br>たん水<br>間断灌水<br>落水 |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 栽培のポイント | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防   | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 | ・根の張り<br>・土壌の改良<br>・肥料の活用<br>・水の管理<br>・病害の予防 |

<施肥設計>

| 肥料名            | 成分       | 元肥   | 穂肥  |
|----------------|----------|------|-----|
| こうべハーベスト       | 18-13-13 | 40kg |     |
| NK-C3号（流し込み施肥） | 18-0-16  |      | 0kg |

慣行栽培

衛星を活用した土壌診断(可給態窒素量12以上)・葉色診断(正規化植生指数NDVI0.6～0.7)により肥量調整

| 元肥   | 穂肥        |
|------|-----------|
| 32kg |           |
|      | (10～15kg) |

元肥はSagriを活用し、可給態窒素量12以上の場合、減肥  
穂肥はxarvioを活用し、葉色(正規化植生指数NDVI0.6～0.7)の場合、追肥

<防除体系>

☆自家育苗の方のみ

|      | 農薬名           | 使用量   | 対象病害虫                                     |
|------|---------------|-------|-------------------------------------------|
| 苗箱防除 | ルーチンエキスパート箱粒剤 | 50g/箱 | いもち病、紋枯病、白葉枯病、いもち病、紋枯病、白葉枯病、いもち病、紋枯病、白葉枯病 |

|         | 農薬名        | 希釈倍数・使用量                   | 使用時期    |
|---------|------------|----------------------------|---------|
| カメムシ類防除 | スタークル粒剤    | 3kg/10a                    | 収穫7日前まで |
|         | または        |                            |         |
|         | スタークル豆つぶ   | 250g/10a                   | 収穫7日前まで |
|         | または        |                            |         |
|         | スタークル顆粒水溶剤 | 2000倍<br>(散布液量60～150ℓ/10a) | 収穫7日前まで |

\*使用適期は出穂後5～10日前後

<除草剤>

| 農薬名       | 使用量                | 使用方法                            |
|-----------|--------------------|---------------------------------|
| キマリテ1キロ粒剤 | 1kg/10a            | 移植時/移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後30日まで) |
| または       |                    |                                 |
| キマリテフロアブル | 500ml/10a          | 移植時/移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後30日まで) |
| または       |                    |                                 |
| キマリテジャンボ  | 300g/10a<br>パック10個 | 移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後30日まで)     |

臨機防除

| 農薬名                 | 使用量(希釈水量)                      | 使用時期                        |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| バサグラン液剤<br>(ナトリウム塩) | 500～700ml/10a<br>(70～100L/10a) | 移植後15～55日まで<br>(但し収穫50日前まで) |

| 農薬名         | 使用量       | 使用方法                            |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| エンペラー1キロ粒剤  | 1kg/10a   | 移植時/移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後60日まで) |
| または         |           |                                 |
| エンペラーフロアブル  | 500ml/10a | 移植時/移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後30日まで) |
| または         |           |                                 |
| エンペラー豆つぶ250 | 250g      | 移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後60日まで)     |

または

|           |                       |                             |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| エンペラージャンボ | 小包装(パック)<br>10個(250g) | 移植直後～ノビエ3葉期<br>(但し移植後30日まで) |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|

臨機防除

| 農薬名          | 使用量(希釈水量)                  | 使用時期                           |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| クリンチャーバスME液剤 | 1000ml/10a<br>70～100ml/10a | 移植後15日～ノビエ5葉期<br>(但し、収穫50日前まで) |