




**!** 本日の  
ワクチンは **ファイザー社製** です

**2回目も必ず1回目と同じワクチンの接種を受ける必要があります**

裏面も必ずご確認ください

### ワクチン接種後よく見られる症状は



●注射した部位の  
腫れや痛み



●筋肉痛  
●関節痛



●頭痛  
●発熱



●倦怠感  
●寒気 ●下痢

これらの症状のほとんどが、接種後数日(2日~3日程度)で回復します

## 自宅で様子を見てください

発熱・関節痛・倦怠感の症状は、1回目の接種後より  
2回目の接種後の方が高い頻度で報告されています

上記のような症状が続き、  
数日後もよくなる場合や、症状がひどい場合は、  
**かかりつけ医** にまずはご相談ください

かかりつけ医に連絡が取れない時間帯や、医療機関への受診に悩んだときは

神戸市新型コロナワクチン  
副反応医療相談窓口

# 078-252-7155

24時間  
対応

## 本日のワクチンはファイザー社製です

- ワクチンの効果を十分得るためには、同じワクチンを2回接種する必要があります。
- 1回目の接種後、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(次の予約を取ってください)
- 2回目の予約は、本日接種したワクチンと同じワクチン(ファイザー)が接種できる会場を予約してください。接種会場(集団・大規模)ごとにワクチンが異なりますのでご注意ください。
- 接種したワクチンの種類は、接種券の「予防接種済証」でも確認できます。
- ご自身が接種したワクチンの種類が分からない場合は、神戸市 新型コロナワクチン接種コールセンターでも確認できます。

【お問い合わせ】 神戸市 新型コロナワクチン接種コールセンター  
受付時間：平日(月～金) 8時30分～20時00分 / 休日(土日祝) 8時30分～17時30分

TEL 078-277-3320

## 接種当日は…

- 注射した部分は清潔に保つようにしましょう。
- 接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は、こすらないようにしましょう。
- 当日の激しい運動は控えましょう。

ワクチン接種の1回目と2回目の間隔が、  
3週間以上空いてしまった場合は、どのようにすればいいですか？

➡ できる限り速やかに2回目の接種を受けてください。

1回接種しただけでも、免疫はつきますか？

➡ ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、  
2回目の接種を受けてから7日程度と言われています。

免疫がついたら、マスクはしなくてもいいのですか？

➡ ワクチン接種後も基本的な感染予防対策(マスク着用、密集・  
密接及び密閉の回避、手洗いや咳エチケット等) は必要です。  
(感染を予防する効果はまだ認められていません)