


BCG 백신 접종 전에 알아야 할 주의점

BCG(결핵)는 생백신입니다. 예방접종 일정을 잘 확인하시고 접종 당일 모자건강수첩과 예방접종권 묶음, BCG 예방접종 신청서 및 예진표(파란색 박스)를 반드시 지참하여 주시기 바랍니다. 모자건강수첩을 가져오지 않아 접종이력을 확인하지 못하는 경우에는 접종을 거부당할 수 있습니다.

◆ 2020년 10월부터 종류가 서로 다른 백신의 접종 간격이 다음과 같이 변경되었습니다.

<2020년 10월 이후 접종>



불활성화 백신과 경구용 생백신은 접종 후 두어야 했던 접종 간격 제한이 없어졌습니다.

주사용 생백신 접종 후에 주사용 생백신을 접종하는 경우에만 접종 간격이 27일 이상 벌어져있는지 확인합니다!

【BCG 접종 전날까지의 주의사항】

• 현재 치료 중 또는 경과 관찰 중인 병을 앓고 있는 사람

BCG 접종 가능 여부를 주치의에게 미리 확인하시기 바랍니다. 선천적으로 심장, 신장, 뇌신경, 면역부전증 등의 질환이 있는 사람은 방문할 의료기관으로 미리 연락하여 주시기 바랍니다.

• 상완에 습진이나 상처가 있는 사람

백신을 접종할 상완(바깥쪽 중앙 : 어깨 조금 아래)에는 보습제※를 제외하고는 가급적 전날까지만 바르고 당일에는 바르지 마십시오. 주치의로부터 매일 거르지 않고 약을 바를 것을 권장받은 경우에는 방문할 의료기관으로 미리 문의하여 주시기 바랍니다.

※ 접종 당일에는 약수첩을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

※ 보습제는 스테로이드가 함유되어 있지 않은 것만 가능합니다.

• 주치의로부터 접종 가능하다는 확인을 받은 경우라도 최종적인 접종 여부는 접종하는 의사가 판단합니다.

【BCG 접종 시 주의사항】

젓 포함 등을 방지하기 위해서 접종 후 30분 동안은 수유를 하지 마시기 바랍니다.

접종 부위를 청결하게 말리기 위해서...

- 보호자의 머리가 길다면 접종 부위에 닿지 않도록 묶습니다.
- 접종 부위는 손대지 말고 자연적으로 말립니다(마르는데 10분 정도 걸립니다).
- 옷이나 타올, 가방이 접종 부위에 닿지 않도록 주의합니다.
- 완전히 말랐는지 직원의 확인을 받고 나서 옷을 입힙니다.

마르고 나서도 접종 부위를 세게 긁거나 문지르지 않도록 합니다.

접종 당일 목욕도 가능합니다. 몸을 씻거나 할 때 접종 부위를 문지르지 않도록 주의합니다.

BCG 뿐만 아니라 예방접종 직후 극히 드물게 쇼크증상(발한, 부어오름, 두드러기, 오심, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 접종 후 30분 동안은 자녀의 상태를 잘 관찰하여 주시기 바랍니다.

접종 부위는 상완 바깥쪽 중앙(어깨 조금 아래)입니다. 이 부위가 안전하고 바늘 자국도 비교적 많이 남지 않습니다.

BCG 백신 접종 후

【BCG 백신 바늘 자국의 정상적인 경과】

- 접종 후 3~5 주 경과하면 바늘 자국이 수 밀리미터 크기로 빨강게 부풀어오르고 그 끝이 노르스름하게(작은 농주머니) 된 후 딱지가 형성됩니다. 자연스럽게 아물기 때문에 약은 바르지 않습니다.
- 이후 딱지가 떨어지고, 접종 후 3~4 개월은 바늘 자국이 도드라져 보이거나 점점 열어집니다.

【코흐현상】

코흐현상이란 결핵에 감염된 경우에 나타나는 접종 부위의 일련의 반응으로, 접종 후 3 일 이내에 바늘 자국에 발적(빨강게 됨)이나 농이 나타나며 접종 후 5~7 일경 딱지가 형성됩니다. 이러한 반응이 나타나면 결핵 검사를 해야 하므로 방문한 의료기관에 문의하시기 바랍니다. 또한 결핵 감염이 아니더라도 접종 후 일과성으로 빨강게 붓는 경우도 있으므로 아이의 기분이나 모유 및 분유의 섭취가 평소와 다르지 않다면 응급진료를 받을 필요는 없습니다. 5~7 일 후에 발적이 사라지고 딱지가 형성되지 않는다면 일과성 반응으로 판단되는데 아이에게 일반적인 반응(3~5 주 후에 바늘 자국이 빨강게 부풀어오르는 것)이 나타나는지 확인하도록 합니다.

【이상반응】

- BCG 접종 당일 열이 나는 경우는 비교적 적습니다.
- 고베시에서 드물게 1 년에 1~2 개의 사례가 나오는 이상반응으로 ①림프절 비대와 ②발진(두드러기)이 있습니다.
 - ① 림프절 비대 : 주사를 접종한 쪽 겨드랑이의 림프절이 부어오를 수 있습니다. 접종 후 2 개월 이상 지나서 발생하는 경우가 많으며(대개 3~6 개월 후) 고름이 나오기도 하나 청결하게 관리하면 반 년 정도면 자연 치유됩니다.
 - ② 발진 : 백신 접종 후 수 개월이 지나서 BCG 관련 발진이 접종 부위가 아닌 부위에도 발생할 수 있습니다.
 - ※①② 모두 별다른 치료 없이 치유되는 경우가 많으며, 아이의 기분이나 모유 및 분유의 섭취가 평소와 다르지 않다면 대부분 문제가 없습니다.
- 고베시에 보고된 바는 거의 없으나 접종한 바늘 자국 부근에 멍울(피하 육아종)이 생기는 사례도 있습니다. 이 경우 치료가 필요할 수 있으므로 피부과에서 진료를 받은 뒤 방문한 의료기관으로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 이상반응과 관련하여 우려되는 사항이 있다면 방문한 의료기관으로 문의하시기 바랍니다.
- 그 밖에 이상이 느껴진다면 방문한 의료기관으로 문의하시기 바랍니다.

