


接种卡介苗 (BCG) 之前的注意事项 (中文版)

卡介苗 (BCG) 是活疫苗。如有其他预防接种的计划, 在确认其前后日程之后, 请于接种卡介苗 (BCG) 当天, 务必携带母子健康手帐、预防接种券簿、卡介苗 (BCG) 预防接种申请表和予诊票 (蓝框部分)。如果因未携带母子健康手帐而无法确认接种记录, 有可能会无法进行接种。

◆ 不同种类疫苗的接种间隔时间从 2020 年 10 月开始做了以下的变更。

〈有关 2020 年 10 月以后的预防接种〉



灭活疫苗 与 口服活疫苗 的接种间隔期限取消了。
只有在接种 注射活疫苗 之后接种 注射活疫苗 的情况时, 需要间隔 27 天以上。

【卡介苗 (BCG) 接种前的注意事项】

- 目前患有疾病正在治疗或正在观察的人
 请向主治医生确认是否可以接种卡介苗 (BCG)。如有先天性心脏、肾脏、脑神经、免疫功能缺陷等方面的疾病, 请事先告知欲前往接种的医疗机构
- 上臂有皮疹或有伤痕的人
 接种疫苗的部位为上臂 (外侧中间: 肩膀的稍下处), 除保湿剂※以外, 请在接种当天不要涂抹任何东西。如果主治医生吩咐需要每天必须涂药, 请事先咨询欲前往接种的医疗机构。
 ※ 请务必在接种当天携带服用药记录手册前来。
 ※ 仅限于不含类固醇成分的保湿剂。
- 即使主治医生同意接种, 接种可否最终仍由进行接种的医生来做判断。

【卡介苗 (BCG) 接种时的注意事项】

接种前后 30 分钟, 请不要喂奶, 以避免宝宝吐奶。

为使接种部位清洁干燥...

- 请长发的家长把头发扎起来, 以免头发碰到宝宝的接种部位。
- 不要触摸接种部位, 使其自然干燥 (需 10 分钟左右)。
- 请注意不要让衣服、毛巾或背包触碰到接种部位。
- 请向工作人员确认是否已干燥之后, 再给宝宝穿衣服。

干燥之后, 也不要抓或蹭接种部位。

接种当天即可洗澡。洗澡时及其他时候不要搓揉接种部位。

不仅限于卡介苗 (BCG), 预防接种之后有极少数人会出现休克状态 (出汗、浮肿、荨麻疹、恶心、呼吸困难等), 请在接种后观察 30 分钟左右宝宝的状况。

接种部位为上臂外侧中间 (肩膀稍下处), 该部位比较安全且不易留下明显的针眼痕迹。

关于接种卡介苗(BCG)之后

【卡介苗(BCG)针眼痕迹的正常过程】

- 接种后3~5周左右针眼处会出现几毫米大小的红肿，然后略变黄色(小脓疱)，最后结痂。结痂会自然脱落，请不要涂药。
- 之后结痂脱落。接种后的3~4个月针眼痕迹比较明显，但会越来越淡。

【科赫现象】

科赫现象是指在感染了结核的情况下，接种部位出现的系列反应。接种后3天之内针眼处红肿或化脓，5~7天左右结痂。如出现类似反应，需要做有关结核方面的检查，请咨询接种的医疗机构。大多数的宝宝在接种后会出现短暂的红肿，而不是结核感染，只要宝宝正常喝奶，未感觉异常的话，则不需要着急挂急诊。5~7天后红肿消退，如果没有结痂，应为短暂性反应，请继续观察反应是否正常(3~5周后针眼痕迹会红肿)。

【关于副反应】

- 卡介苗(BCG)接种当天发烧的情况相对少见。
- 极少出现的副反应，神户市内每年仅1~2例：①淋巴结肿大 和 ②出现皮疹。
 - ① 淋巴结肿大：接种处腋下的淋巴结有可能会肿大。通常在接种完两个月之后出现(大多在3~6个月之后)，也有可能流脓液，只要保持干净，通常半年后会自然转好。
 - ② 皮疹：接种疫苗几个月之后，与卡介苗(BCG)相关的皮疹在接种部位以外也有可能出现。
※①②大都不需要特别治疗，宝宝的情绪或喝奶情况如没有异常，基本上就没什么问题。
- 曾有过接种针眼周围出现肿块(皮下肉芽组织增生)的病例，但在神户市还没有此类报告。出现该情况则需要治疗，请到皮肤科就诊，并联系接种的医疗机构。
- 如担心副反应等相关事宜，请咨询接种的医疗机构。
- 如有其他异常，也请咨询接种的医疗机构。

